



# TACE

## COMO DEVO ME PREPARAR ANTES DO PROCEDIMENTO?

Antes da quimioembolização você irá consultar com o Radiologista Intervencionista. Nesta consulta leve consigo todos os seus exames (exames de sangue, ecografia, tomografia, ressonância, biópsias), informe ao seu médico se tem alergias e sobre quais medicamentos toma, pois alguns podem precisar ser interrompidos ou reduzidos para a embolização. Caso seja necessário, novos exames podem ser solicitados antes do procedimento. No dia da embolização você deverá ir ao hospital com um acompanhante maior de 18 anos, em jejum e com todos os exames.

## COMO É O PROCEDIMENTO?

A quimioembolização é realizada na sala de hemodinâmica, uma enfermeira verificará seus sinais vitais (pressão, batimentos cardíacos, respiração), introduzindo uma pequena agulha em seu braço para que você possa receber medicamentos na veia.

O médico anestesista irá aplicá-la um sedativo para ajudá-lo a relaxar, e após aplicará antibiótico e a anestesia, neste tipo de procedimento, é comum a escolha pela anestesia local e sedação.

Em seguida, o médico Radiologista Intervencionista ou enfermeira limpará sua virilha ou seu punho e o cobrirá com campos esterilizados, e então o médico Radiologista Intervencionista fará um pequeno corte local, por onde será inserido um cateter o qual será levado até as artérias que nutrem o seu fígado, acompanhando todo o caminho percorrido pelo cateter, em tempo real, na imagem que aparece na tela do angiografo.

Uma vez com o cateter dentro do fígado, este será direcionado para o vasos que alimentam o seu tumor, e assim que o médico Radiologista Intervencionista se certificar que o cateter está na posição correta junto ao tumor, a mistura de quimioterápico + material embolizante será injetada. A quimioembolização não costuma ser dolorosa, mas caso ocorra dor esta será controlada com analgésicos aplicados pelo médico anestesista.

A embolização dura cerca de uma hora e ao terminar o cateter será removido e uma compressão será feita no local da pele onde ele foi inserido para que não hajam sangramentos. Caso a punção tenha sido na virilha você ficará em repouso absoluto na cama para manter as pernas paradas por 6 horas após a embolização e evitar sangramentos importantes.

## QUAIS SÃO OS RISCOS?

Pode ocorrer hematoma no local onde foi feita a punção na pele (punho ou virilha). Sagramentos de maior volume são incomuns, e em geral, estão relacionados a repouso inadequado.

O surgimento de infecção dentro no tumor que foi tratado é infrequente, ocorre em até 1% dos pacientes. A maioria se resolve com antibióticos e drenagem percutânea do abscesso.

Embolização acidental de outros vasos além daqueles que se direcionam ao tumor são incomuns.

## O QUE DEVO ESPERAR APÓS O PROCEDIMENTO? QUAL É O PLANO DE ACOMPANHAMENTO?

Na enfermaria, a equipe irá monitorar você, a maioria dos pacientes experimenta o que é chamado de síndrome pós-embolização: dor, náusea ou febre baixa, que podem ser facilmente controladas por medicamentos.

Verificando que você consegue comer e beber, caminhar, ir ao banheiro sem ajuda e controlar sua dor com medicação oral, você poderá ir para casa. Em média os pacientes são mantidos por até 24-48h no hospital.

Em casa, é esperado ter uma febre baixa ligeira, sentir-se cansado e perder o apetite durante 1 a 2 semanas, mas em caso de dor abdominal persistente e/ou mais intensa que logo após a quimioembolização, associada a febre alta e persistente, existe a possibilidade de infecção e você deve comunicar imediatamente a equipe médica.

Nas semanas seguintes ao procedimento, seu oncologista ou hepatologista fará exames de sangue para ver como seu fígado está funcionando. Você retornará para uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética 1-3 meses depois para verificar o resultado do tratamento. Pode ser necessário repetir a quimioembolização mais de uma vez.

**ATENÇÃO:** As orientações contidas neste material são de cunho informativo genérico e não individualizadas para cada paciente. Para maiores esclarecimentos e precisão nos cuidados o médico Radiologista Intervencionista deverá ser consultado.

**Ainda ficou com alguma dúvida?**

**Fale conosco. (51) 3517.2377 / 99404.4041**